

EMÄTTINEN HIIVATULEHDUS

Emättimen hiivatulehdus on tyypillinen sukukypsien naisten vaiva. Hiivatulehduksen aiheuttaja on lähes aina emättimessä muutenkin tavattava *Candida albicans* -niminen hiivasieni, joka on yltenyt liika- kasvuun. Hiivatulehdukselle altistavat esimerkiksi raskaus, antibioottien tai ehkäisytablettien käyttö, liian tiukat vaatteet, hengittämättömät siteet tai suojat. Laukaisevaa tekijää ei aina tunnisteta.

OIREET

Hiivatulehduksen tyypillisiä oireita ovat voimakas kirvely, kutina tai ärsyttävä tunne sekä vaalea, tuoksuton vuoto. Valkovuoto on kokkaremaista, vaaleaa, seinämiin tarttuvaa.

Ulkosynnyttimien limakalvolla voi olla pieniä haavaumia ja punoitusta. Emättimen hiivatulehdukseen ei yleensä liity muita oireita, kuten kuumetta, alavatskipuja tai virtsaamisvaikeuksia.



ET OLE YKSIN

Hiivatulehdus on varsin yleinen naisten gynekologinen vaiva. On arvioitu, että jokainen nainen sairastaa ainakin kerran elämässään hiivatulehduksen.

Hiivatulehdus onkin yksi naisten lääkäriin hakeutumisen yleisimpiä syitä ja yleisin syy gynekologin vastaanotolla käynteihin.

Meillä on sinulle helppo ja nopea ratkaisu hiivatulehduksen hoitoon – Diflucan. Lisää tietoa Diflucanista löydät tämän potilasoppaan sivuilta ja osoitteesta www.diflucan.fi



HIIVATULEHDUKSEN KERTAHOITO DIFLUCAN- VALMISTEELLA

– yksi kapseli suun kautta riittää

Jos olet aikaisemmin sairastanut emättimen hiivatulehduksen, jonka lääkäri on todennut ja tunnistat oireet, voit hoitaa tautia ilman reseptiä saatavilla lääkevalmisteilla.

Diflucan kerta-annoshoidon yhtä tehokas hiivatulehduksen hoidossa kuin emätinpuikkoina tai -voiteina annosteltavat hoidot. Diflucan alkaa vaikuttaa nopeasti, ja sen vaikutus emättimessä kestää kolmen päivän ajan. Yleensä oireet helpottavat jo ensimmäisen hoitopäivän aikana.

Diflucanin etuna on helppo ja siisti suun kautta annostelu kerta-annoksena. Lisäksi voit aloittaa Diflucan-hoidon välittömästi, eikä sinun tarvitse odottaa hoidon aloittamista iltaan asti kuten emätinpuikoilla tai -voiteilla.

Niele Diflucan-kapseli kokonaisuina vesilasillisen kanssa. Voit ottaa kapselin joko aterian yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Diflucan[®]
helposti eron hiivatulehduksesta
www.diflucan.fi



Pfizer

Diflucan®

helposti eroon hiivatulehduksesta

Yksi kapseli suun kautta riittää.

Diflucan on tehokas, helppo ja nopea hoito hiivatulehdukseen. Nyt apteekista ilman reseptiä.

Pfizer

RASKAUS JA IMETYS

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Valmisteen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana ei suositella, ellei lääkäri toisin määrää.

MUIDEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ DIFLUCANIN KANSSA

Joidenkin lääkkeiden tai Diflucan-kapseleiden teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti.

Diflucan-kapseleita ei saa käyttää samanaikaisesti sisapridin (suolen liikkeitä parantava lääke), kinidiinin (rytmihäiriölääke), pimotsidin (psykenlääke), terfenadiinin tai astemitsolin (allergialääkkeitä) kanssa. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Ehkäisyvalmisteita voit käyttää yhtä aikaa Diflucan-hoidon kanssa.

TÄRKEÄÄ TIETOA DIFLUCAN-KAPSELEIDEN SISÄLTÄMISTÄ AINEISTA

Diflucan-kapseli sisältää 149 mg laktoosia (sokeria). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.



MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Diflucan voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Diflucan on yleensä hyvin siedetty.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, vatsakipu, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, maksan toimintakokeiden poikkeavat tulokset ja ihottuma. Tarkempaa tietoa mahdollisista haittavaikutuksista saat pakkausselosteesta.

VINKKEJÄ ENNALTAEHKÄISYYN

- Noudata hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Vältä kuitenkin liian tiheitä pesuja, saippuan käyttämistä ja suihkuttamista suoraan emättimeen. Liikahygienia saattaa aiheuttaa oireita. Jos käytät pesuaineita, niiden pH:n tulee olla alle 7.
- Vältä voimakkaasti hajustettujen hygieniatuotteiden käyttöä.
- Käytä ilmavia keinokuituisia, merseroidusta puuvillasta tai silkistä valmistettuja alusvaatteita.
- Vältä paljon sokeria sisältävää ravintoa. Sen sijaan hiivalla kohotettuja leivonnaisia ei tarvitse välttää.

MILLOIN LÄÄKÄRIIN

Lääkärin vastaanotolle on syytä hakeutua, jos:

- Sinulla on oireita ensimmäistä kertaa
- Olet alle 16- tai yli 60-vuotias
- Sinulla on hiivatulehduksia usein
- Olet raskaana
- Sinulla esiintyy epäsäännöllisiä verisiä vuotoja tai pahanhajuista vuotoa
- Sinulla on alavatsakipuja ja/tai kuumetta
- Sukupuolielimissä on rakkuloita
- On syytä epäillä, että oireet aiheutuvat sukupuolitaudista
- Myös miehellä on oireita
- Sinulla on virtsaamisvaikeuksia
- Itsehoito ja itselääkintä eivät 3 vuorokaudessa lievitä oireita tai oireet eivät viikossa parane
- Polttava tunne ja ärsytys lisääntyvät tai oireet pahenevat hoidon aikana.

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ennen valmisteen käyttöä.